

Zoologie obratlovců – Ptáci IX (4)



Řád: pěvci (Passeriformes)

Čeledi: konipasovití (Motacillidae), pěnkavovití (Fringillidae), strnadovití (Emberizidae)

Čeled': Konipasovití - Motacillidae

Znaky:


- Téměř celý svět, severní druhy tažné
- 58 druhů, v ČR 10 druhů (7 hnízdících)
- 13 - 22 cm, 12 - 50 g
- Otevřené biotopy a břehy vod
- Potrava: drobní bezobratlí (hmyz, plži) a semena
- Pozemní ptáci se štíhlým tělem a šídlovitým zobákem,
- Ocas delší až dlouhý, vesměs světlá vnější rýdovací pera
- Dlouhé tenké nohy s delšími prsty i drápy (zvláště zadní prst), pobíhají
- Křídla středně velká a špičatá, let ve vlnovkách
- Opeření u konipasů kontrastní, rozdílné u samců a samic; u lindušek nenápadné a shodné u obou pohlaví
- Hnízdí jednotlivě na zemi nebo v polodutinách, 2 - 7 vajec, inkubace 12 – 20 dní, mláďata, 1 - 2 hnízdění.

Konipas horský (*Motacilla cinerea*), k. luční (*M. flava*), k. bílý (*M. alba*), linduška lesní (*Anthus trivialis*), l. luční (*A. pratensis*), l. úhorní (*A. campestris*), l. horská (*A. spinoletta*).


Konipas bílý (*Motacilla alba*)




Konipas horský (*Motacilla cinerea*)




Konipas luční (*Motacilla flava*)




Konipas citronový (*Motacilla citreola*)




Linduška lesní (*Anthus trivialis*)




Linduška luční (*Anthus pratensis*)



Linduška úhorní (*Anthus campestris*)



Linduška horská (*Anthus spinoletta*)




Čeled': Pěnkavovití - Fringillidae

Znaky:


- Celosvětově, většina táhne
- 124 druhů, v ČR 18 druhů (12 hnízdících)
- 11 - 19 cm, 9 - 100 g
- hlavně lesy, porosty křovin a kulturní krajina
- Potrava: semena, mláďata na hnízdě hmyz
- Zobák silný, krátký až středně dlouhý, kónický, většinou špičatý, někdy překřížený
- Nohy a chodidla krátká
- Ocas středně velký
- Samci většinou větší a pestřejší nebo stejně zbarveni jako samice
- Křídla středně dlouhá až dlouhá, okrouhlá nebo špičatá, let vlnitý
- Hnízdí jednotlivě nebo ve volných koloniích v otevřených hnízdech ve větvích stromů či keřů, 3 - 5 vajec, inkubace 12 – 14 dní, mláďata krmivá, 1 . 2 hnízdění.

Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), p. jikavec (*F. montifringilla*), stehlík obecný (*Carduelis carduelis*), čížek lesní (*C. spinus*), konopka obecná (*C. cannabina*), k. žlutozobá (*C. flavirostris*), čečetka zimní (*C. flammea*), zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*), zvonek zelený (*Carduelis chloris*), hýl obecný (*Pyrrhula pyrrhula*), h. rudý (*Carpodacus erythrinus*), křivka obecná (*Loxia curvirostra*), dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)


Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)




Pěnkava jikavec (*Fringilla montifringilla*)






Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)




Hýl obecný (*Pyrrhula pyrrhula*)




Hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*)






Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)




Konopka obecná (*Carduelis cannabina*)




Čečetka zimní (*Carduelis flammea*)




Křivka obecná (*Loxia curvirostra*)




Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*)



Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)



Čížek lesní (*Carduelis spinus*)




Čeled': Strnadovití - Emberizidae

Znaky:


- Celosvětově, kromě Austrálie a Antarktidy, stálí, severní druhy táhnou
- 583 druhů, v ČR 14 druhů (4 hnízdící)
- 9 - 28 cm, 9 - 40 g
- Otevřená stanoviště, řídké porosty dřevin a okraje lesů
- Potrava: hlavně semena a plody, mláďata na hnízdě hmyz
- Zobák tlustý, středně dlouhý, kónický a špičatý
- Nohy krátké až středně dlouhé, chodidla vesměs slabá
- Ocas středně dlouhý až dlouhý
- Zbarvení u obou pohlaví stejné nebo odlišné
- Křídla dlouhá špičatá, bez vnějších ručních letek, dobří letci
- Hnízdí jednotlivě na zemi nebo v nízké vegetaci, 4 - 5 vajec, inkubace 10 – 18 dní, mláďata krmivá, 1 - 3 hnízdění.

Strnad luční (*Miliaria calandra*), s. obecný (*Emberiza citrinella*), s. zahradní (*E. hortulana*), s. rákosní (*E. schoeniclus*), sněhule severní (*Plectrophenax nivalis*)




Strnad luční (*Miliaria calandra*)




Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)



Strnad zahradní (*Emberiza hortulana*)



Strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*)



Sněhule severní
(*Plectrophenax nivalis*)

